Epidémio Périnatalité





Les usages chez les femmes

- Pathologies gynécologiques avec lien de causalité
 - Diminution fertilité : OR 1,7 (>10 cig/jr)
- Vaginose: OR 5,7 • Abcès du sein : OR 8
- Cancer du sein: risque X 2

Les usages chez les femmes enceintes

De 20 à 25 % des femmes enceintes fument (surtout les plus jeunes et les moins diplômées)

80 % Des fumeuses qui arrêtent pendant la grossesse le font au 1er Trimestre

17 % continuent parmi lesquelles (28 % fument > 10 cig/jr

Des femmes ayant arrêté du fait de leur grossesse ont repris après l'accouchement⁴

Consommation en 2016 :

- France
- Pays de la Loire



22 %

Avant la grossesse

Consommation tabac 3ème Trimestre

16 %

Les risques chez le fœtus & le nourrisson

- Pathologies obstétricales avec lien de causalité
 - GEU: risque X de 3 à 5
 - FCS: risque X 2
 - Placenta mal inséré et placenta praevia : RR 1,37
 - Malformations: RR 1,28
 - RCIU: RR 3 > 20cig/jr // RR 4,5 >30 cig/jr
 - MFIU au 3ème T: RR 1,23
 - Prématurité: RR 1,38
- Tabagisme parental: FDR principal (62 %) de MIN (Mort Inattendue Nourrisson)
- Infections ORL et bronchiques (1,3-1,7) si tabagisme parental
- Fumer pendant la grossesse augmente le risque de mortalité infantile d'environ 40 %
- Coliques X 2 si mère fumeuse 1
- Obésité : RR 1,5¹



Information par les professionnels de santé



Soit 1 fumeuse enceinte / 5 a reçu le conseil d'arrêter totalement par le médecin ou la sage-femme suivant sa grossesse

- ADDICTOLOGIE
- <u>Référentiel Tabac Périnatalité, Réseau périnatalité Naitre et Grandir ensemble en Langedoc Roussilon validation 05 janvier 2017</u>
- Guide Respadd 2013- L'USAGE DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES DURANT LA GROSSESSE 6/ Les drogues et leurs effets sur le développement du fœtus
- <u>L'essentiel sur Alcool, tabac, cannabis et grossesse ..MILDECA, juin 2020</u>
- Baromètre de Santé Publique France 2017 Alcool et Tabac durant la grossesse
- Bulletin Santé publique tabac en pays de Loire-Janvier 2019







