

+ Epidémiologie Périnatalité



Tabac




Les usages chez les femmes

- Pathologies gynécologiques avec lien de causalité ¹
 - Diminution fertilité : OR 1,7 (>10 cig/jr)
 - Vaginose : OR 5,7
- Abscesses du sein : OR 8
- Cancer du sein: risque X 2 ²




Les usages chez les femmes enceintes

De 20 à 25 % des femmes enceintes fument (surtout les plus jeunes et les moins diplômées) ³



En 2016 ⁵ :



Les risques chez le fœtus & le nourrisson

- Pathologies obstétricales avec lien de causalité ¹
 - GEU : risque X de 3 à 5
 - FCŠ : risque X 2
 - Placenta mal inséré et placenta praevia : RR 1,37
 - Malformations : RR 1,28
 - RCIU : RR 3 > 20cig/jr // RR 4,5 >30 cig/jr
 - MFIU au 3ème T : RR 1,23
 - Prématurité : RR 1,38
- Tabagisme parental : FDR principal (62 %) de MIN (Mort Inattendue Nourrisson) ¹
- Infections ORL et bronchiques (1,3-1,7) si tabagisme parental ¹
- Fumer pendant la grossesse augmente le risque de mortalité infantile d'environ 40 % ²
- Coliques X 2 si mère fumeuse ¹
- Obésité : RR 1,5¹

Information par les professionnels de santé

- 63 % Soit plus de 6 femmes enceintes / 10 déclarent avoir été informées (par médecin ou sage-femme) des risques de la consommation de tabac durant le suivi de leur grossesse ⁴
- 20 % Soit 1 fumeuse enceinte / 5 a reçu le conseil d'arrêter totalement par le médecin ou la sage-femme suivant sa grossesse ⁴

¹ Référentiel Tabac Périnatalité, Réseau périnatalité Naitre et Grandir ensemble en Languedoc Roussillon validation 05 janvier 2017
² Guide Respad 2013- L'USAGE DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES DURANT LA GROSSESSE 6/ Les drogues et leurs effets sur le développement du fœtus
³ L'essentiel sur l'alcool, le tabac, le cannabis et la grossesse...MILDECA, juin 2020
⁴ Baromètre de Santé Publique France 2017 - Alcool et Tabac durant la grossesse
⁵ Bulletin Santé publique tabac en pays de Loire-Janvier 2019