

Mise à jour
JUILLET 2024

NALOXONE

La mise à disposition
des kits de naloxone,
une mesure de
prévention

Plaquette informative



Les décès liés aux surdoses d'opioïdes peuvent être évités par l'alerte rapide des secours, l'administration de la naloxone et la réalisation de gestes simples de premiers secours.

**LA NALOXONE
SAUVE DES VIES !**



À QUI DIFFUSER LA NALOXONE ?

- *Consommateurs d'opioïdes et leur entourage.*

Une mesure de prévention

- Les opioïdes sont impliqués dans la majorité des décès liés à l'abus de substances.
- Dans de nombreux cas, ces surdoses ont lieu en présence d'un témoin.
- La naloxone, antidote spécifique aux opioïdes, est disponible sous formes nasale ou intra-musculaire utilisables par tous.

Pour qui et dans quelles situations ?

Évaluer systématiquement la pertinence d'une délivrance / prescription pour toute personne consommant des opioïdes et leur entourage, en particulier dans les situations suivantes :

- Après arrêt ou diminution des prises d'opioïdes (perte de tolérance aux opioïdes) liés à des changements d'environnement (sortie d'hospitalisation, de prison...).
- Antécédents de surdose.
- Instauration de traitement de substitution aux opioïdes, ou dans le mois suivant son arrêt, en particulier méthadone, ou instauration d'un traitement antalgique opioïde chez un sujet naïf.
- Troubles de l'usage d'opioïdes (médicaments antalgiques, utilisateurs occasionnels recherchant les effets psychoactifs des opioïdes, usagers en « autosubstitution »...).
- Association à des substances potentialisant le risque de surdose (ex : gabapentinoïdes, benzodiazépines, alcool, etc.).

Signes de surdose aux opioïdes

- Détresse respiratoire (fréquence < 10 / min, cyanose lèvres et ongles).
- Troubles de la conscience (sédation, coma aréactif).
- Présence d'éléments (objets, circonstances) évoquant une consommation ou témoins.

Le myosis est un signe d'imprégnation aux opiacés (mais pouvant être contrecarré par la prise d'autres substances).

Formes de naloxone disponibles (mise à jour juin 2024)



NOM COMMERCIAL	NYXOÏD® <i>depuis septembre 2021</i>	PRENOXAD® <i>depuis juin 2019</i>	VENTIZOLVE® <i>depuis octobre 2023</i>
INDICATION	Traitement d'urgence des surdoses opioïdes chez les sujets > 14 ans	Traitement d'urgence des surdoses opioïdes chez les sujets > 18 ans	Traitement d'urgence des surdoses opioïdes chez les sujets > 18 ans
CONDITIONNEMENT	2 pulvérisateurs d'1 dose	Seringue préremplie de 5 doses en IM	2 pulvérisateurs d'1 dose
ADMINISTRATION	Appel secours (15 ou 112) puis 1 ^{re} dose, réitérer si pas d'amélioration ou ré-aggravation, mettre en PLS et surveiller jusqu'à l'arrivée des secours		
PRESCRIPTION MÉDICALE	Obligatoire	Facultative	Facultative
DISPENSATION	Officine, CSAPA, Hôpital, CAARUD	Officine, CSAPA, CAARUD, Hôpital	CSAPA, CAARUD, (officine et hôpital en cours)
PRIX / REMBOURSEMENT	31,40 € / taux : 65 %	22,16 € / taux : 65 %	Non fixé à la publication de la plaquette
COMMANDE	Mail : pharmacie@csp-epl.com Fax : 09 71 00 70 35	Grossistes	-

FORMATIONS ET INFORMATIONS

➔ Vidéos du projet SINFONI porté par le CEIP-A de Nantes :

La Naloxone en
pharmacologie...



... et en pratique
clinique



- ➔ NYXOID® : mundipharma.fr//nos_medicaments/antidote
- ➔ PRENOXAD® : prenoxad.fr
- ➔ Recommandations HAS : « Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses » 2022 : has-sante.fr, rubrique Toutes nos publications
- ➔ Ministère des Solidarités et de la Santé : solidarites-sante.gouv.fr, rubrique Prévention en santé > Addictions
- ➔ « Une heure pour apprendre à sauver une vie » : naloxone.fr

Des informations complémentaires ainsi qu'un annuaire des professionnels en addictologie et dispositifs de soutien (groupes d'entraide, lignes d'écoute, etc.) sont disponibles sur le site :

 srae-addicto-pdl.fr



Flashez ce QR code pour consulter
la dernière version mise à jour



SRAE ADDICTOLOGIE DES PAYS DE LA LOIRE
2 rue de la Loire - 44200 Nantes

Document réalisé avec le soutien de l'ARS Pays de la Loire.